MODIFIKASI SELEKSI *EAR TO ROW* MENJADI SELEKSI *SPIKE TO HOLE* PADA GANDUM AUSTRALIA

Surya Seno Pamungkas*, dan Djoko Murdono

Universitas Kristen Satya Wacana
Gedung Dipo 66 Jalan, Diponegoro 66 Salatiga 50711

* 512014049@student.uksw.edu

Abstrak

Penelitian ini melakukan modifikasi seleksi “*ear to row*” pada jagung yang diubah menjadi “*spike to hole*” untuk penyesuaian pada tanaman gandum. Modifikasi yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus menyeleksi dan mengelompokkan potensi benih gandum Australia yang didapat dengan metode ini. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk data deskriptif disertai gambar dokumentasi tanaman gandum Australia yang ditanam dalam penelitian ini. Setidaknya didapatkan 4 tipe gandum Australia yang berpontesi untuk dikembangkan pada iklim tropis Indonesia. Keempat tipe gandum yang didapat dalam penelitian ini memiliki kode tipe 1, tipe 2, tipe 1a, dan tipe 2a. Perbedaan keempat tipe gandum Australia dalam penelitian ini terlihat secara visual, yaitu pada tipe 1 memiliki warna malai tua berwarna kuning pucat sedangkan pada tipe 2 memiliki warna kuning emas yang terlihat lebih pekat. Pada tipe 1 dan tipe 2 juga memiliki umur panen pada 113HST lebih awal dibandingkan tipe 1a dan tipe 2a. Secara visual tipe 1a dan tipe 2a memiliki ciri yang serupa dengan tipe 1 dan tipe 2, hanya saja pada umur panen gandum tipe 1a dan 2a lebih lambat 14 hari yaitu pada 127HST.

Kata Kunci : Gandum Australia, Gandum Tropis, Tongkol ke Baris

*Submit: 8 April 2021 * Revisi: 16 April 2021 * Accepted: 25 April 2021 * Publish: 10 Mei 2021*

PENDAHULUAN

Uji coba penanaman benih gandum yang berasal dari biji gandum konsumsi dari Australia yang dilakukan oleh Pusat Studi Gandum FPB UKSW pada tahun 2019 pada wilayah tropis, menghasilkan biji gandum yang cukup bagus. Meskipun nilai keseragaman benih tersebut cukup rendah, hasil penanaman benih gandum konsumsi dari Australia tersebut setidaknya memiliki 3 kelompok yang terlihat. Potensi benih gandum yang diperoleh dari hasil uji coba tersebut diharapkan mampu menciptakan atau mendapatkan benih gandum tropis baru yang lebih berkualitas dan memiliki hasil produksi yang tinggi.

Proses pemanenan hasil uji coba benih gandum Australia pada tahun 2019 tidak dirontokkan melainkan disimpan dalam bentuk malai. Malai hasil panen tersebut dapat dijadikan materi genotipe yang baru jika dilakukan seleksi secara berkesinambungan. Metode seleksi untuk mendapatkan materi genetik yang seragam adalah metode “*ear to row*” yang dilanjutkan “*row to block*”. Metode yang diterapkan merupakan modifikasi atau penyesuaian metode seleksi genotipe yang dilakukan pada tanaman jagung.

Metode seleksi genotipe benih gandum Australia pada penelitian ini melakukan modifikasi pada seleksi genotipe jagung dengan melakukan penanaman biji tongkol jagung pada satu baris tanam. Modifikasi dilakukan karena tanaman gandum tidak bertongkol, melainkan bermalai atau spike sehingga metode seleksi disebut “*spike to hole*”. *Hole* atau Lubang tanam yang diterapkan pada seleksi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan jumlah biji pada malai gandum yang tidak sebanyak biji pada tongkol jagung.

Jumlah biji gandum dalam satu malai berkisar antara 20 hingga 40 biji gandum. Berdasarkan jumlah biji pada gandum dalam satu malai yang dapat ditanam dalam satu lubang tanam, dapat meningkatkan efektivitas pengendalian gulma dengan pemasangan mulsa plastik pada bedengan. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat kompetisi pada tanaman gandum yang diakibatkan gulma yang berpotensi tumbuh pada bedengan. Terjadinya kompetisi pada tanaman gandum yang akan diseleksi akan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan dan tingkat hasil tanaman (Widyawati, 2013).

Metode seleksi “*spike to hole*” merupakan seleksi tahap pertama untuk benih gandum Australia karena benih gandum dari Australia merupakan benih uji coba kali pertama di Indonesia. Metode tersebut akan dilanjutkan dengan metode seleksi “*hole to block*” yang dilakukan dengan menanam tanaman gandum pada kelompok lubang tanam seragam yang lolos seleksi. Modifikasi yang dilakukan bertujuan selaras dengan metode “*ear to row*” untuk menyempurnakan materi genetik pada tetua yang digunakan (Romadhona *et al.*, 2014 dan Amzeri, 2019). Penelitian seleksi genotipe gandum terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia *et al.*, (2014), Wardani *et al.*, (2015), dan Kadir *et al.*, (2019), menggunakan pola galur tanam pada gandum. Metode “*spike to hole*” penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter dan melakukan seleksi pada benih gandum dari Australia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Penelitian Sanghrila Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen

Satya Wacana yang terletak di Dusun Jurug, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang – Jawa Tengah. Dilaksanakan pada 17 Mei 2020 hingga 22 September 2020 dengan 1750 malai yang ditanam dan diamati. Jarak tanam yang digunakan adalah 30cm x 20cm pada bedengan dengan lebar 120 cm dengan diameter lubang tanam 7,5cm.

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan didukung data kuantitatif dengan metode penelitian survey, pengamatan pertumbuhan tanaman gandum, analisis laboratorium dan tinjauan pustaka. Data diperoleh langsung dari pengamatan mengenai 10 fase pertumbuhan tanaman gandum Australia. Parameter kualitatif yang diamati dalam penelitian ini adalah lapisan lilin pada daun, warna ligula, Ada tidaknya *Awn*, Arah gerak *awn*, warna malai muda, warna malai tua, warna biji masak dan usia panen. Parameter kuantitatif yang diamati pada penelitian ini adalah tinggi akhir tanaman, populasi dan jumlah malai tanaman, panjang malai dan jumlah spikelet. Penelitian ini juga didukung pengamatan data selintas, dan secara keseluruhan data disajikan dalam dengan konsep deskriptif eksplorasi sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Mei 2020 hingga bulan September 2020 setidaknya menghasilkan populasi yang dapat bertahan dan telah lolos seleksi sebanyak 615 *hole*. Proses seleksi sejak awal tanam menyisihkan 1135 *hole* yang tidak lolos seleksi disebabkan oleh beberapa faktor ketidak seragaman tanaman

gandum, atau kerusakan parameter data pada tanaman gandum dalam satu *hole*.

Penyeleksian meliputi seleksi benih tidak dapat tumbuh, seleksi tanaman layu atau rusak, dan tanaman gandum yang mati. Jangka waktu penanaman hingga panen terhitung secara keseluruhan adalah 127 hari. Waktu tersebut termasuk untuk proses seleksi yang dilakukan setiap minggu sejak awal masa tanam.

Proses seleksi yang dilakukan setiap minggu juga dilakukan untuk mengamati karakter tanaman gandum pada setiap stadia dan pengamatan iklim mikro yang menjadi parameter selintas pada penelitian ini. Waktu tersebut merupakan keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses panen gandum periode pertama pada 113 HST, dan panen gandum periode kedua pada 127 HST. Pada periode panen pertama dan periode panen kedua mendapatkan hasil panen dengan 2 tipe gandum yang berbeda. Parameter selintas yang diamati pada penelitian ini tersaji dalam Tabel 1.

Terjadinya perbedaan usia panen tanaman gandum diduga karena benih gandum Australia yang ditanam pada penelitian ini masih melakukan adaptasi. Gandum tropis biasanya dapat dipanen pada usia 85HST hingga 115HST tergantung ketinggian tempat budidaya. Semakin tinggi lokasi budidaya tanaman maka akan semakin lama usia panen tanaman gandum (Puslitbang Tanaman Pangan, 2016; Widowati *et al.*, 2016).

Tabel 1. Parameter Selintas Penelitian Kondisi Iklim Mikro pada Lokasi Penelitian

Rata-rata Suhu dan Kelembaban Per Bulan			
No.	Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
1.	Mei 2020	27,80	69,86
2.	Juni 2020	27,34	61,73
3.	Juli 2020	26,54	61,20
4.	Agustus 2020	26,10	63,60
5.	September 2020	28,38	70,67

Kondisi iklim mikro lokasi penelitian

Tanaman yang tidak dapat tumbuh dapat diketahui pada 14HST, pada usia tersebut tanaman telah memasuki stadia pertumbuhan anakan. Dapat diketahui benih pada lubang tanam yang dapat tumbuh maupun yang tidak dapat tumbuh yang disebabkan kerusakan benih. Kerusakan benih dapat terjadi karena pada saat panen hingga penyimpanan memiliki kadar air yang terlalu tinggi (Andriani & Isnaini, 2013).

Tanaman gandum yang terseleksi akibat layu yang ditandai dengan menguningnya bagian tanaman diduga karena terjadinya kompetisi antar tanaman. Pada budidaya gandum tropis biasanya digunakan jarak tanam 2-5cm untuk jarak dalam baris dan 25-30 cm jarak antar baris, pada setiap baris tanam hanya ditebar 1 hingga 2 benih pada setiap titik tumbuh benih gandum. Sehingga lubang tanam berukuran diameter 7,5cm dengan jarak antar lubang 20cm x 30cm yang ditebari benih gandum satu malai utuh yang berkisar 40 benih mengakibatkan kompetisi antar tanaman gandum.

Hilangnya potensi data yang diambil pada penelitian ini juga disebabkan oleh kerusakan data yang diakibatkan oleh serangan hama tikus dan cuaca buruk yang terjadi pada stadia akhir tanaman gandum. Kerusakan data tanaman gandum yang diakibatkan oleh hama tikus menyebabkan beberapa malai

pada rumpun gandum di lubang tanam berkurang dan menyisakan batang tanaman gandum.

Parameter Kualitatif

Pengambilan parameter kualitatif yang diamati pada penelitian ini meliputi lapisan lilin pada daun tanaman gandum, warna ligula, ada tidaknya *Awn* atau buluh, arah gerak *Awn*, warna malai muda, warna malai tua, warna biji masak dan usia panen. Hasil pengamatan parameter kualitatif pada penelitian ini tersaji dalam Tabel 2.

Karakter daun berlilin pada gandum Australia dimiliki oleh semua genotipe yang didapat, hal ini dicirikan dengan daun yang berwarna hijau pucat sebelum tanaman gandum memasuki fase akhir atau seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Ciri lain yang dapat dilihat daun pada tanaman gandum tidak terlihat basah Ketika terkena air melainkan memiliki efek seperti daun talas. Tanaman gandum Australia memiliki warna ligula berwarna hijau kekuningan yang terlihat pada daerah pangkal daun seperti pada Gambar 2. Keberadaan *Awn* atau buluh pada ujung malai gandum terdapat pada kedua tipe gandum dikedua periode panen. Arah gerak *awn* menunjukkan arah vertikal atau mengarah keatas. Tampak visual pada malai muda di kedua tipe pada kedua periode panen

memiliki kesamaan yaitu berwarna hijau pucat. Perbedaan yang tampak adalah Ketika malai tua, pada gandum Australia tipe 1 memiliki warna kuning pucat dan pada gandum Australia memiliki warna kuning emas seperti yang dapat dilihat

pada Gambar 3. Meskipun berbeda pada warna malai tua yang Nampak, tetapi warna biji masak pada gandum Australia terlihat sama yaitu memiliki warna cokelat tua.

Tabel 2. Karakter Visual dan Usia Panen Tanaman Gandum Australia

Tabel Kualitatif					
No.	Parameter	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 1a	Tipe 2a
1	Lapisan Lilin pada daun	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Warna Ligula	kuning kehijauan	kuning kehijauan	kuning kehijauan	kuning kehijauan
3	<i>Awn</i>	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Arah Gerak <i>Awn</i>	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
5	Warna malai Muda	Hijau Pucat	Hijau Pucat	Hijau Pucat	Hijau Pucat
6	Warna Malai Tua	<i>Kuning Pucat</i>	Kuning Emas	<i>Kuning Pucat</i>	Kuning Emas
7	Warna Biji Masak	Cokelat Tua	Cokelat Tua	Cokelat Tua	Cokelat Tua
8	Usia Panen	113 HST	113 HST	127 HST	127 HST

Karakterisasi tanaman gandum australia pada penelitian ini

Gambar 1. Lapisan lilin pada daun gandum Australia

Gambar 2. Warna Ligula pada Tanaman Gandum Australia

Gambar 3. Warna Malai Muda dan Malai Masak Gandum Australia

Berdasarkan ciri visual yang didapat belum ditemukan kesamaan spesifik seperti yang ada pada klasifikasi yang ditetapkan oleh (Wheat Quality Australia, 2015). Hal ini diduga karena faktor adaptasi yang terjadi pada benih gandum australia yang ditanam pada lingkungan tropis.

Parameter Kuantitatif

Pengambilan parameter kuantitatif pada penelitian ini meliputi tinggi akhir tanaman, populasi dan jumlah malai, panjang malai, dan jumlah spikelet. Parameter tersebut bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri tanaman gandum Australia yang di tanam pada lingkungan tropis lebih spesifik melalui data kuantitatif. Parameter kuantitatif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Kuantitatif Gandum Australia

Tabel Kuantitatif									
No.	Parameter	Tipe 1		Tipe 2		Tipe 1a		Tipe 2a	
		Rata-rata	St.dev	Rata-rata	St.dev	Rata-rata	St.dev	Rata-rata	St.dev
1	Tinggi Akhir Tanaman	86.97	3.44	87.85	4.43	89.50	5.79	90.08	4.63
2	Populasi & Jumlah Malai	46	19.96	42	15.92	16	17.14	39	17.39
3	Panjang Malai	8.00	0.62	8.00	0.71	8.00	0.81	8.15	0.82
4	Jumlah Spikelet	17	2.41	18	2.52	15	2.52	19	2.8

Karakterisasi kuantitatif gandum Australia pada penelitian ini

Karakter tinggi tanaman pada kedua tipe gandum Australia memiliki perbedaan yang bervariasi. Berdasarkan data ada Tabel 3. Dapat dilihat bahwa tinggi tanaman yang paling tinggi adalah tipe 2a yang memiliki rata-rata tinggi 90.08cm dengan standar deviasi pada 4.63. meskipun begitu, tanaman gandum Australia yang digunakan pada penelitian ini tergolong memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan gandum tropis yang sudah ditanam di Indonesia yang memiliki rata-rata tinggi optimal pada 61,08cm.

Tanaman gandum dapat menghasilkan malai pada setiap batang tanaman, pada batang utama akan berbeda daripada malai batang anakan. Sehingga jumlah tanaman gandum akan sama dengan jumlah malai. Berdasarkan tabel populasi dan jumlah malai, data menunjukkan bahwa secara keseluruhan populasi tanaman dan jumlah malai sangat beragam. Tanaman gandum tipe 1 pada penelitian memiliki nilai rata-rata populasi lebih tinggi dibanding tanaman gandum tipe 2. Hal tersebut diduga dikarenakan tanaman gandum tipe 1 memiliki jumlah anakan yang lebih banyak dibandingkan jumlah anakan tanaman gandum tipe 2. Jumlah anakan pada tanaman gandum dipengaruhi oleh

kesesuaian lingkungan tumbuh tanaman gandum, dan perlakuan yang diberikan (Wicaksono *et al.*, 2016 dan Kurnia *et al.*, 2017).

Panjang malai pada tanaman gandum relatif seragam pada batang utama, sedangkan pada batang anakan tanaman gandum akan menghasilkan malai yang lebih pendek. Tinggi tanaman pada gandum Australia pada penelitian ini memiliki rata – rata yang tidak jauh berbeda dari beberapa jenis gandum yang pernah ditanam di wilayah tropis Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nur *et al.*, (2010), Kurnia *et al.*, (2015), Wahyu *et al.*, (2013), menunjukkan data panjang malai gandum berkisar antara 7,5cm hingga 11cm. Kondisi panjang malai pada tanaman gandum dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh, perlakuan, dan kepadatan populasi pada setiap rumpun (Widyawati, 2013).

Jumlah spikelet pada keempat tipe yang didapat dari gandum Australia pada penelitian kali ini memiliki rata – rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah spikelet pada gandum tropis yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Data dari penelitian yang dilakukan oleh Nur *et al.*, (2012), Wardani *et al.*, (2015) menunjukkan data bahwa gandum tropis

yang ditanam pada dataran tinggi hanya memiliki jumlah spikelet sebanyak 9 hingga 15 spikelet. Sedangkan pada gandum Australia yang digunakan dalam penelitian ini memiliki rata-rata jumlah spikelet terendah 15 dan memiliki rata-rata nilai tertinggi adalah 19 spikelet.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada benih gandum Australia yang telah ditanam pada lingkungan tropis, dapat disimpulkan bahwa karakter tanaman gandum Australia terbagi menjadi 2 tipe yang tampak secara visual dan memiliki 2 periode panen yang berbeda yaitu pada 113 HST dan 127 HST. Genotipe seragam pada gandum Australia sebanyak 615 lubang tanam yang dikelompokkan menjadi 4 tipe gandum yaitu gandum dengan warna malai masak berwarna kuning pucat periode 1 (tipe 1), gandum dengan warna malai masak berwarna kuning emas periode 1 (tipe 2), gandum dengan warna malai masak berwarna kuning pucat periode 2 (tipe 1a), gandum dengan warna malai masak berwarna kuning emas periode 2 (tipe 2a).

Saran

Beberapa kekurangan dalam penelitian ini dengan penerapan pola tanam “*spike to hole*” memberikan saran untuk meningkatkan penelitian lanjutan untuk mendapatkan genotipe unggul dari pengembangan gandum Australia pada wilayah tropis. Saran tersebut disampaikan pada beberapa poin berikut:

1. Perlunya perubahan metode malai ke lubang menjadi malai baris tanam untuk penelitian lanjutan dengan jarak tanam standar antara

jarak dalam baris (5cm) dan jarak antar baris (25cm) agar kepadatan populasi gandum tidak terlalu tinggi.

2. Pemberian perlakuan untuk mengendalikan OPT agar tanaman gandum dapat tumbuh dengan baik.
3. Penambahan parameter umur per stadia agar dapat menjabarkan keberlangsungan stadia gandum pada hari setelah tanam (HST).
4. Perlunya dilakukan pengukuran bobot sampel untuk mengetahui potensi hasil dari setiap tipe.

Perlunya analisa warna tepung biji gandum agar dapat dilakukan pendekatan klasifikasi sesuai standar yang berlaku pada Wheat Quality Australia, (2015).

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pusat Studi Gandum Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana yang telah melakukan pendampingan dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amzeri, A. (2019). Seleksi Satu Tongkol Satu Baris (Ear to Row Selection) pada Tanaman Jagung (*Zea mays* L.). *Journal of Science and Technology*, 12(1), 18–23. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v12i1.5228>
- Andriani, A., & Isnaini, M. (2013). Morfologi dan Fase Pertumbuhan Gandum. *Balai Penelitian Tanaman Pangan*, 2(2), 69–106.
- Kadir, M., Kaimuddin, K., Musa, Y., Farid, M., Syahrudin, K., & Nur,

- A. (2019). Seleksi Genotipe Gandum Tropis Toleran Suhu Tinggi Menggunakan Marka SSR. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 19(2), 61–66.
<https://doi.org/10.25047/jii.v19i2.1498>
- Kurnia, T. D., Murdono, D., Widyawati, N., & Priyanto, S. H. (2014). Seleksi Ketahanan 10 Genotipe Gandum (*Triticum aestivum* L.) dengan Proline sebagai Penanda Terhadap Cekaman Suhu Tinggi dan Kekeringan. *Prosiding Seminar Nasional Bioteknologi*, 1(1), 1–9.
- Puslitbang Tanaman Pangan. (2016). *Gandum - Peluang Pengembangan di Indonesia* (R. H. Praptana & Hermanto (eds.)). IAARD PRESS.
- Romadhona, R. F., Basunanda, P., & Murti, R. H. (2014). Perbandingan Kemajuan Genetis Seleksi Massa dan Tongkol - Ke Baris pada Populasi Generasi Ketiga Persarian Bebas jagung Hibrida (*Zea Mays* L.). *Vegetalika*, 3(2), 72–84.
- Wardani, S., Wirnas, D., & Wahyu, Y. (2015). Seleksi Segregan Gandum (*Triticum aestivum* L.) pada Dataran Tinggi. *Jurnal Agronomi Indonesia*, 43(1), 45–51.
- Wheat Quality Australia. (2015). *Wheat Classification Guidelines* (Issue October).
- Widowati, S., Khumaida, N., Ardie, S. W., & Trikoesoemaningtyas. (2016). Karakterisasi Morfologi dan Sifat Kuantitatif Gandum (*Triticum aestivum* L.) di Dataran Menengah. *Jurnal Agron Indonesia*, 44(2), 162–169..